


16ème message technique, message du mercredi 22 mai 7h

Feu bactérien

Hier en fin de journée, nous avons observé à peine quelques fleurs ouvertes sur poiriers dans un secteur chaud de la région. Nous n'avons pas de risque d'infection sur ces fleurs pour l'instant (voir l'image ci bas). Sachez que selon le modèle des stades phénologiques (Mc Intosh), le stade **pleine floraison** est prévu pour la semaine prochaine... Certainement, des fleurs ouvriront avant cette date... **Dès maintenant, vérifiez bien vos parcelles afin de bien cerner la journée d'ouverture des fleurs de pommiers et poiriers.** Enfin, vous comprendrez l'importance d'avoir sous la main de la Streptomycine ou Blossom Protect !

	Risques	Nul	Faible	Élevé	Extrême	Exceptionnel
Scénario 1 : Pas de feu bactérien dans votre secteur régional l'année précédente		0-300	300-500	500-800	800 et +	
Scénario 2 : Présence de feu bactérien dans votre secteur régional l'année précédente		0-100	100-200	200-350	350-500	500 et +
Scénario 3 : Présence de chancres actifs et/ou de feu bactérien dans votre secteur régional		pas une option	0-100	100-200	200-300	300 et +



Tavelure

Une nouvelle station météo est nouvellement en fonction dans la région. Elle est située au 865 Montée du village à St-Joseph-du-lac. Ainsi, pour les vergers avoisinants cette station, nous changerons aujourd'hui la station météo reliée pour l'utilisation des modèles.

Les postes St-Joseph Montée (865 Montée du village, St-Joseph-du-lac) et Oka Ste-Sophie ont enregistré 0.2mm de pluie vers 19-19h30 hier. Notez bien que ce pissouillet n'entraînera pas d'infection et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le RI pour Oka Ste-Sophie devrait se terminer dans les prochaines heures et celui de St-Joseph Montée est déjà terminé. Par contre, pensez à vous protéger avant la pluie qui est prévue demain fin pm...

Tt insecticide pré-floral

Punaise terne : Nous sommes rendus au stade où ce ravageur peut laisser des dommages sur fruits... Si vous avez le seuil d'intervention (3 captures cumulatives/pièges) intervenez avec une pyrèthre de synthèse dans la période d'activité de la punaise soit en fin d'après-midi ou début de soirée + absence de vent + $T > 15C$. Nous avons une fenêtre pour intervenir ce soir.

Avec la présence de ruches dans plusieurs parcelles ou dans les environs + la présence de pissenlits dans les vergers, effectuez cette intervention après $\pm 18h$ lorsque les pissenlits sont fermés.

Hoplocampe : Des premiers relevés de pièges ont été réalisés hier. Très peu de parcelles ont le seuil d'intervention à ce jour (4 captures cumulatives / pièges)... à suivre !

Sachez qu'il est interdit de faire un insecticide durant la floraison !!!

Divers

- **Engrais foliaire** : Prévoir au stade bouton rose de débiter les applications d'engrais foliaire (azote, bore, manganèse). Pour ceux qui appliquent le dithane ou le manzate, inutile de faire des applications foliaires de manganèse, ces fongicides en contiennent déjà. **En régie biologique, il existe du bore et manganèse permis en pomiculture biologique.**
- **Apport d'engrais pour les plantations de l'année et pépinière** : N'oubliez pas que 10 à 15 jours après votre plantation un 2^e apport de 10-52-10 est nécessaire. Vérifiez bien l'humidité du sol avant de faire cet apport. Si l'humidité est suffisante, reportez de quelques jours.
- **Confusion sexuelle du carpocapse** : Si ce n'est déjà fait, il faut installer les diffuseurs de phéromones ds les prochains jours...