

TAVELURE

Risques météorologiques d'infection

La période de mouillure a commencé lundi vers 20h pour Oka Ste-Sophie et dans la nuit de lundi à mardi vers 2h-4h pour les autres stations. Aucun séchage n'a eu lieu depuis hier matin. L'HR est remontée dans la nuit et ce matin entre 6h et 7h, nous pouvions observer de l'humectation sur le feuillage.

Résumé des données pour chaque station :

Station	Heures de Mouillure	T moyenne	Cumul de pluie	Risque atteint
Oka Ste Sophie	26h	14.7C	5.8mm	Risque Grave
Oka	19h	14.1C	5.8mm	Risque Moyen
St Benoît Mirabel	16h	15.3C	4.2mm	Risque Moyen
STJ640	18h	14.7C	5.2mm	Risque Moyen
STJ Montée	21h	14.0C	4.6mm	Risque Moyen
STJ	21h	14.8C	5.8mm	Risque Grave

Petit rappel : pour les vergers dont la litière était mouillée lundi soir à 20h, considérez-vous dans la même situation que Oka Ste Sophie.

Développement foliaire

Sur la parcelle de référence, entre mardi 17h et ce mercredi matin 6h30, 40% des pousses ont développé au moins une feuille.

Maturité des ascospores

Nous sommes toujours dans la période des éjections massives.

ANALYSE

Nous retenons 3 cas de figure :

- ✚ **1^{er} cas de figure : Vous avez réalisé un B2K hier (mardi) matin :** ce matin à 7h vous êtes rendus au RI Léger depuis 2h-3h du matin. Des spores ont été éjectées dans la journée hier + ce matin. Étant donné que le feuillage ne présente plus assez d'eau libre pour réaliser un 2^{ème} B2K, réaliser un pénétrant sur feuillage sec. Vous pouvez choisir un pénétrant efficace contre la tavelure uniquement.

✚ **2^{ème} cas de figure : Vous avez réalisé un B2K en début PM mardi** : ce matin à 7h vous êtes rendus au risque Minimal. Réaliser un fongicide de contact dès que possible afin de contrôler le restant des spores de cette infection.

✚ **3^{ème} cas de figure : Vous avez réalisé un fongicide de contact avant l'atteinte du RI Léger hier dans la journée** : si votre produit a pu adhérer au feuillage, celui-ci vous a protégé jusqu'à concurrence d'un lessivage ou d'un développement foliaire. En raison du développement foliaire observé cette nuit, vous étiez partiellement protégés pour la fin de l'infection. Aussi, pour une protection sans faille, réaliser un pénétrant sur vos variétés sensibles et vos parcelles avec inoculum sur feuillage sec. Vous pouvez choisir un pénétrant efficace contre la tavelure uniquement.

Pour les entreprises en régie biologique, pour remplacer le pénétrant proposé dans le conventionnel utiliser de la BSC si votre huile remonte à + de 8 jrs.

Feu bactérien

Des risques sont prévus vendredi pour les entreprises en scénario 3 et pour la fin de semaine pour toutes les entreprises sur les fleurs qui ont ouverts le 16 mai et avant. Évidemment, cela a le temps de changer dix fois d'ici là avec nos « très bonnes » prévisions météo cette année. Ayez votre produit en main si un traitement est nécessaire. Un message sera envoyé en début d'après-midi avec les nouvelles prévisions, notamment pour les entreprises en régie biologique puisque le Blossom Protect doit être appliqué au moins 18h avant l'infection.

Pour un rappel sur le modèle et les doses de produit voir le [8^{ème} message technique 2024](#).