

Charançon de la prune

Des sorties sont encore prévues **pour toutes les entreprises** ce soir et jeudi soir. Le charançon se fait plaisir depuis lundi...

- ✚ **Pour les entreprises qui sont intervenues dimanche soir pendant les heures d'activités :**
Réaliser un traitement contour ce soir de 18h à 22h ±. Celui-ci vous permettra de contrôler la sortie de ce soir et demain soir
- ✚ **Pour les entreprises qui ont réalisé leur traitement contour lundi soir :** Vous devrez réintervenir jeudi soir avec un traitement contour pendant les heures d'activités (de 18h à 22h ±)

Pour la régie biologique, vérifiez l'état de protection de vos fruits. Avec les T des derniers jours ceux-ci ont grossi rapidement et **votre couverture est très probablement insuffisante**, même si elle date de lundi seulement. Au besoin, faire 2 passages coup sur coup avant la période d'activité de ce soir.

Tavelure

Nous avons trouvé des taches de tavelure dans les derniers jours. **Dans le cas où vous avez des taches présentes dans votre verger, il ne doit plus avoir usage de pénétrants cette saison, aussi bien contre la tavelure et/ou contre le blanc.**

Le découvert depuis votre dernière intervention est très important. Réaliser votre prochain traitement dans de bonnes conditions (vent <10km/h) afin de rejoindre toutes les feuilles et bien couvrir vos fruits pour la prochaine infection. La croissance foliaire tend vers la fin (50% des pousses ont terminé leur croissance), cependant vos fruits ont besoin d'être protégés puisque ceux-ci grossissent à vitesse grand V depuis la fin de semaine. Collez-vous le plus possible à la prochaine période de mouillure. Attention aux T caniculaires que nous avons, éviter de traiter lorsqu'il fait + de 30C. *Les traitements au soufre ne doivent pas être réalisés lorsqu'il fait + que 25C au moment du traitement et dans les heures suivantes.*

Oïdium (blanc)

Nous sommes dans une période propice au développement du blanc depuis la semaine passée à tous les jours (ou presque). Nous trouvons régulièrement des symptômes dans les vergers. De ce fait, bien que nous sommes dans une période propice à son développement, les pénétrants visant cette maladie ne devraient plus être utilisés. Les seules options restantes qui sont non sujettes au développement de résistance sont les apports réguliers de soufre et/ou le mélange B2K.

Lors de votre taille d'été, éliminer les symptômes de blanc en les coupant dans le bois sain (voir photo). Ceci contribuera à baisser votre inoculum puisque le champignon passe l'hiver dans l'arbre.

Pousse atteinte par le blanc



Divers

- **Irrigation** : N'oubliez pas de mettre en route votre système d'irrigation. Les pluies orageuses ont tendance à lessiver plutôt que pénétrer dans le sol. Leurs apports dans le sol est donc limité ! Appliquer la règle de 1 temps d'arrosage pour 2 temps de repos.
- **Pépinières et plantations de l'année** : Pensez à supprimer les fleurs afin d'éviter toute infection de feu bactérien... Également, faire les travaux nécessaires (désherbage, Tt phyto, etc.)