

Charançon de la prune

Dame charançon fera sa sortie ce soir **pour toutes les entreprises** (pouch pouch rouges). Depuis les derniers jours nous observons régulièrement des dommages de charançon dans plusieurs parcelles ET dans plusieurs vergers. Vérifiez vos zones à historique.

- ✚ **Régie conventionnelle** : Réaliser un traitement en contour ce soir entre 18h et 22h, s'il ne pleut pas et que les rafales de vent ne sont pas présentes évidemment ! Si vous avez trouvé du dommage à l'intérieur de votre parcelle, le traitement contour ne sera pas suffisant pour le contrôler... mieux vaudrait intervenir sur ces parcelles au complet plutôt qu'en contour uniquement. Consulter l'affiche PFI pour les produits et doses.

- ✚ **Régie biologique** : **Vérifiez que vos fruits, et non votre feuillage**, sont bien recouverts de blanc ! Il s'agit d'une barrière physique... Le but est que dame charançon trouve vos fruits non viables pour la survie de sa progéniture et qu'il est difficile de pondre sur ceux-ci. Dans le cas où la couverture est insuffisante, réaliser un traitement à base d'argile en dilué d'ici 18h si les rafales de vent le permettent.

Mouche de la pomme

Il est temps d'installer vos sphères pour la mouche de la pomme. Dans le cas où vous utilisez un attractif, installez-le en même temps que le piège. L'attractif est à suspendre au-dessus de la sphère.

Autres ravageurs

Dans les jeunes parcelles, pépinières et surgreffage --> Vérifiez la présence de **punaise de la molène**, **puceron vert** et **cicadelle de la pomme de terre**. **ATTENTION** pour la punaise de la molène : si elle est en présence de pucerons, celle-ci s'occupera de les manger plutôt que de s'attaquer à vos jeunes pommiers ! Dans ce cas-ci, l'intervention pourrait ne pas être nécessaire.

Oïdium

Étant donné les symptômes que l'on retrouve régulièrement dans presque tous les vergers, **l'usage de pénétrants est fortement non recommandé**. Utilisez plutôt le mélange B2K + Soufre, à réaliser sur feuillage sec pendant une infection. La prochaine aura lieu à partir de demain vendredi jusqu'au 18 juin. Cette infection mettra fin à la période de sporulation sur vos symptômes de l'an passé. **Le meilleur moyen de vous aider pour la saison prochaine est de baisser votre inoculum en taillant**. Voir [le 24ème message technique](#) pour un rappel sur la taille.

Ajustement de la charge

Il est temps de voir à l'ajustement de la charge fruitière afin de bonifier votre récolte (taux de sucre, calibres, coloration...).

Quelques précisions : Enlever en priorité les fruits qui sont sur la face inférieure des ramifications. Supprimer aussi les + petits fruits. Et notez bien qu'il est possible de laisser 2 fruits sur le même

bouquet si ces 2 fruits sont gros... N'hésitez pas à contacter votre conseiller si vous avez des questions sur le sujet !

Fertilisation foliaire

N'oubliez pas vos apports de calcium en juin (3 apports). Il s'agit de la meilleure période pour concentrer le calcium dans vos fruits. Réaliser aussi une application de magnésium entre la mi-juin et la fin juin.

DIVERS

- **Feu bactérien** : Ouvrez bien l'œil, nous avons trouvé **à peine** quelques symptômes d'infection sur fleurs dans la région.
- **Surgreffage** : Ne pas appliquer d'herbicide cette saison sur les rangs où du surgreffage a été réalisé ce printemps.
- **Tavelure** : Pensez à maintenir votre protection au lessivage ou aux 7 jrs durant la phase d'incubation.
- **Complexe Suie-Moucheture** : aucun risque d'infection prévu dans les prochains jours.